

文章總數: 1 篇

1. 香港經濟日報 | 2018-10-29  
報章 | A30 | 港聞

## 血管介入治療 減中風死亡率

【本報訊】本港每年有過萬人中風，但能在黃金時間內在公院接受藥物治療不足一成。

有關團體指仍有3間公院未有24小時急性中風溶栓治療服務，倡改善，並落實24小時中風血管介入治療，減中風致殘及死亡率。

54歲、從事會計的朱先生向來身體健康，但因長期側頭講電話，曾出現肩頸痛。他今年4月放假時，突然感到迷茫，手部無力，曾嘗試報警，但未能清楚說出家中地址，惟有致電在附近的朋友協助，送院急救。

### 團體促公院 24小時治療

朱的主診醫生、神經外科專科醫生黃秉康憶述，病人送院時嚴重中風，半邊身癱瘓、幾乎無個人意識、亦不能說話，診治後發現因頸部血管撕裂中風，懷疑與頸部創傷有關，但不肯定是否因長期側頭講電話。朱說醫生安排他接受血管介入治療，語言表達能力在術後翌日回復8至9成，出院後保持運動及注意飲食。

香港中風基金執行委員會秘書、腦內科專科醫生霍偉明表示，現時公院主要使用俗稱「打溶血針」的溶栓治療處理急性中風個案，在病人發病4.5小時內注射溶血劑，使堵塞的血管流通，救活病人未完全壞死的腦細胞。

黃秉康解釋，血管介入治療黃金治療時間為6小時，適用於較大的血管阻塞，約有2成急性中風病人適用，並可配合使用傳統溶血針，接受血管介入治療的中風者，康復後可獨立生活的機率，比打溶血針高出近1倍。

香港中風基金會主席、神經外科專科醫生方道生指，本港少於5%醫院每年進行多於20次血管介入治療，反映治療在港未充分利用。他建議全港公院推24小時溶栓治療，並盡快實現全港性24小時血管介入治療服務。

文章編號: 201810293229625

本內容經慧科的電子服務提供。以上內容、商標和標記屬慧科、相關機構或版權擁有人所有，並保留一切權利。使用者提供的任何內容由使用者自行負責，慧科不會對該等內容、版權許可或由此引起的任何損害 / 損失承擔責任。

慧科訊業有限公司 查詢請電: (852) 2948 3888 電郵速遞: sales@wisers.com 網址: <http://www.wisers.com>  
慧科訊業有限公司 (2018)。版權所有, 翻印必究。