

伊院新法減中風死亡率

【新報訊】缺血性中風病人若能在中風3小時內接受靜脈溶栓治療，可減低死亡風險。伊利沙伯醫院急症室會為有中風症狀病人臨床診斷，盡快為缺血性中風患者進行靜脈溶栓治療，在過去兩年，最少為72名中風病人治療，減低死亡機會三至四成。

每年處理逾千宗

伊利沙伯醫院急症室每年處理逾千宗中風病人。於2008年12月，他們推行了一項跨部門先導計劃，由急症室醫生臨床診斷中風病人，在確定為缺血性中風後，便立即通知腦神經科醫生為病人進行腦掃描及診斷。

伊院內部副顧問醫生方榮志表示，接受血栓溶解治療後，一成入院有嚴重半身不遂的病人可直接出院，21%病人有顯著改善，如手腳完全不可動。臨床結果顯示，接受治療每8人有1人完全康復出院，其治療成效及安全性，與國際標準相若。

伊院新法減中風死亡率

【新報訊】缺血性中風病人若能在中風3小時內接受靜脈溶栓治療，可減低死亡風險。伊利沙伯醫院急症室會為有中風症狀病人臨床診斷，盡快為缺血性中風患者進行靜脈溶栓治療，在過去兩年，最少為72名中風病人治療，減低死亡機會三至四成。

每年處理逾千宗

伊利沙伯醫院急症室每年處理逾千宗中風病人。於2008年12月，他們推行了一項跨部門先導計劃，由急症室醫生臨床診斷中風病人，在確定為缺血性中風後，便立即通知腦神經科醫生為病人進行腦掃描及診斷。

伊院內部副顧問醫生方榮志表示，接受血栓溶解治療後，一成入院有嚴重半身不遂的病人可直接出院，21%病人有顯著改善，如手腳完全不可動。臨床結果顯示，接受治療每8人有1人完全康復出院，其治療成效及安全性，與國際標準相若。